Sydänsairaala

Sepelvaltimotaudin hoidon vaikuttavuus: ohitusleikkaus

Tilanne 31.7.2026

Demografiset tiedot	**Pirkanmaa**
Mies	86 %
Nainen	14 %
Ikäjakauma	
Alle 60-vuotiaat	12 %
60–69-vuotiaat	38 %
70–79-vuotiaat	41 %
80-vuotiaat ja vanhemmat	9 %

Riskitekijät	**Pirkanmaa**
Diabeteetikoiden osuus sepelvaltimotautipotilaista	41 %
Dyslipidemia *Dyslipidemia tarkoittaa veren poikkeavia rasva-arvoja. Veren rasva-arvot ovat poikkeavat, jos potilas käyttää kolesterolilääkitystä tai kokonaiskolesteroli on yli 5 mmo/l ja/tai LDL-kolesteroli on yli 3 mmo/l.*	85 %
Sukurasitus *Henkilöllä on sukurasitus, jos joku hänen vanhemmistaan tai sisaruksistaan (alle 55-vuotias mies tai alle 65-vuotias nainen) on sairastanut sydäninfarktin, tai hänelle on tehty pallolaajennus tai ohitusleikkaus*	52 %
Tupakointi	8 %
Verenpainetauti	76 %

Toimintakyky ja elämänlaatu (PROM)	**Pirkanmaa**
Elämänlaatu ja toimintakyky *paljon tai hieman parempi* 3 kk ohitusleikkauksen jälkeen (15D)	53 %
Elämänlaatu ja toimintakyky *paljon tai hieman parempi* 12 kk ohitusleikkauksen jälkeen (15D)	79 %
Potilaan oma arvio terveydentilasta 3 kk ohitusleikkauksen jälkeen (VAS asteikolla 0–100)	+ 19 pistettä (70 > 89)
Potilaan oma arvio terveydentilasta 12 kk ohitusleikkauksen jälkeen (VAS asteikolla 0–100)	+ 5 pistettä (70 > 75)

Palvelukokemus (PREM)	**Pirkanmaa**
Suositteluhalukkuus NPS	87
Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhteistyössä kanssani (asteikko 1–5)	4,9

Kliiniset tulosmittarit	**Pirkanmaa**
Onnistuneet hoidot ilman vakavaa komplikaatiota ohitusleikkauksella hoidetuilla potilailla *Vakavalla komplikaatiolla tarkoitetaan aivoinfarktia, sydäninfarktia ja kuolemaa*	89,5 %
Uusintainfarktit *Osuus potilaista, jotka ovat saaneet uuden, invasiivisen tutkimuksen vaatineen, sydäninfarktin vuoden kuluessa ensimmäisestä sydäninfarktista*	2,6 %
Osuus potilaista, jotka ovat saavuttaneet 3 kk:n kuluessa sepelvaltimotautidiagnoosista:	
LDL-tason alle 1,4 mmol/l	68 %
LDL-tason alle 1,8 mmo/l	84 %
Osuus potilaista, jotka ovat saavuttaneet 12 kk:n kuluessa sepelvaltimotautidiagnoosista:	
LDL-tason alle 1,4 mmol/l	80 %
LDL-tason alle 1,8 mmo/l	92 %
Verenpainetaso hoitotavoitteessa:	
Osuus potilaista, joiden verenpainetaso on henkilökohtaisessa hoitotavoitteessa 3 kk:n kuluessa sepelvaltimotautidiagnoosista	75,4 %
Osuus potilaista, joiden verenpainetaso on henkilökohtaisessa hoitotavoitteessa 12 kk:n kuluessa sepelvaltimotautidiagnoosista	87,7 %
Suunnittelematon sairaalahoitojakso (readmissio) *Readmissio on kiireellisenä alkanut sairaalajakso, joka alkaa 30 vrk:n sisällä kotiutumisesta*	4,4 %

Etähoito	**Pirkanmaa**
Osuus potilaista, jotka ovat olleet aktiivisia OmaSydän-etähoitopalvelun käyttäjiä 3 kuukauden ajan diagnoosin jälkeen	88 %

Osuus potilaista, jotka olivat aktiivisia OmaSydän-etähoitopalvelun käyttäjiä 3 kuukauden kohdalla ja jatkoivat aktiivista käyttöä vuoden seurannan loppuun saakka	100 %
OmaSydän-etähoitopalvelussa mukana olleet potilaat, jotka keskeyttivät etähoidon 3–12 kk välillä	0 %

Resurssien käyttö	**Pirkanmaa**
Keskimääräinen (mediaani) odotusaika varjoainekuvaukseen *viimeisen 3 kk:n aikana*	21 vuorokautta
Toimenpiteen jälkeisen uuden pallolaajennuksen tai ohitusleikkauksen tarve:	
3 kk toimenpiteestä	3,3 %
6 kk toimenpiteestä	3,3 %
12 kk toimenpiteestä	3,3 %
Kiireellisen pallolaajennuksen (PCI) tarve PCI-toimenpide *7 vrk:n sisällä CAGB-toimenpiteestä (päivystyksenä tai samalla sairaalahoitojaksolla)*	0,8 %

Haittatapahtumat	**Pirkanmaa**
Aivoinfarkti *Ohitusleikkauksen komplikaationa*	7,0 %
Ohitusleikkauksen infektiot:	
Välikarsinatulehdus (mediastiniitti)	0,0 %
Jalkahaavainfektio	1,8 %

Kokonaiskuolleisuus *)	**Pirkanmaa**
Kokonaiskuolleisuus vuoden kuluessa sepelvaltimotautidiagnoosista *Sisältää kaikki kuolinsyyt, myös muut kuin sydänperäiset*	2,8 %

**) Mukana varjoainekuvauksessa sepelvaltimotautidiagnoosin saaneet potilaat ajalla 31.7.2024–30.7.2025*
Sisältäen kaikki sepelvaltimotautidiagnoosin saaneet potilaat (mm. äkilliset sydäninfarktit)